


Söödaodra väetamisprogramm

Suviodra intensiivne kasvatus, eesmärgiks saak 6 t/ha



Seemnete külveelne
töötlemine

Koos külviga

BBCH 13-25
3. lehe faasist kuni
võrsumise keskpäigani

BBCH 25-32
Võrsumise keskpäigast
kuni 2. kõrresõlmeni

BBCH 37-42
Lipulehe ilmumisest
kuni viljatapp on
pikenenud

YaraMila[®]

NPK(S)*
21-6-12-(9), B, Mg
350-400 kg/ha

YaraBela[®]

AXAN 27N-4S
120-200 kg/ha

YaraVita[®]

GRAMITREL**
1,0-2,0 l/ha

YaraTera[®]

TENSO COCKTAIL
100 g/t

KRISTALONTM
20-20-20
3,0-5,0 kg/ha

* Või **YaraMila NPK(S) 20-5-15-(5), B**. Piisava kaaliumisisaldusega muldade puhul soovitame kasutada **YaraMila NPK(S) 18-9-9-(5), B, Mg**, suurema fosforivajaduse puhul **YaraMila NPK(S) 18-11-13-(7), B, Mg** või **YaraMila NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg**.

** Kasutada, kui taimestikul on arenenud piisavalt suur lehepind. Teise võimalusena võib kasutada leheväetist **YaraVita UNIVERSAL BIO 2,5 l/ha**.

Mulda viidav väetis

Leheväetis

Puhtimisvahend

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.