

Taliodra väetamisprogramm



	Koos külviga	BBCH 12-25 Alates 2. lehe faasist		BBCH 25-29 Võrsumisfaas	BBCH 30-32 Kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlmeni	BBCH 37-39 Lipulehe faas
YaraMila®		NPK(S)* 9-12-25-(7), B, Mg 200-300 kg/ha		NPK(S)* 18-11-13-(7), B, Mg 150-200 kg/ha või NPK(S) 20-5-15-(5), B 150-200 kg/ha		
YaraBela®				AXAN** 27N-4S 200-300 kg/ha	AXAN** 27N-4S 100-200 kg/ha	
YaraVita®			GRAMITREL 1,0 l/ha ja/või MANTRAC PRO 0,5-1,0 l/ha ja/või KOMBIPHOS 2,0-3,0 l/ha	GRAMITREL 1,0 l/ha ja/või KOMBIPHOS 2,0-5,0 l/ha***	GRAMITREL 1,0-2,0 l/ha	UNIVERSAL BIO 1,0-2,0 l/ha

* Või **YaraMila NPK(S) 20-5-15-(5), B** või **NPK(S) 8-24-24-(7), B** või **NPK(S) 18-11-13-(7), B, Mg** või **NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg** või **NPK(S) 7-20-28-(8), B, Mg**.

** Või **YaraBela SULFAN 24N-6S**.

*** **YaraVita KOMBIPHOS**'i kasutada madala fosforisisaldusega muldade puhul või siis, kui fosfori omastamine taimede poolt mullast on häiritud.

■ Mulda viidav väetis

■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.