

Talirapsi väetamisprogramm



	Koos külviga	BBCH 12-24 2-9. lehe faas		BBCH 25-27 Leheroseti moodustumine	BBCH 30-33 Varsumine	BBCH 33-39 Varsumine	BBCH 55-59 Õiepungade moodustumise faas
YaraMila [®]		NPK(S)* 17-11-12-(10), B, Mg 200-300 kg/ha		NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg 150-200 kg/ha			
YaraBela [®]			AXAN** 27N-4S 100-150 kg/ha	SULFAN 24N-6S 200-250 kg/ha	SULFAN 24N-6S 250 kg/ha	SULFAN 24N-6S 150-200 kg/ha	
YaraVita [®]			BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha	BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + BORTRAC 1,5 l/ha		BRASSITREL PRO 1,5-2,0 l/ha + BORTRAC 1,0-1,5 l/ha	THIOTRAC 3,0-5,0 l/ha
YaraLiva [®]			KOMBIPHOS 2,0-3,0 l/ha	KOMBIPHOS 2,0-3,0 l/ha			NITRABOR*** 200-300 kg/ha

* Madala K ja P sisaldusega muldade puhul soovitame kasutada

YaraMila NPK(S) 9-12-25-(7), B, Mg või **YaraMila NPK(S) 7-20-28-(8), B, Mg** või **YaraMila NPK(S) 8-24-24-(7), B** või **YaraMila NPK(S) 8-11-13-(7), B, Mg**

** Sügisene **YaraBela AXAN**'i kogus sõltub põhiväetise kogusest ja valemist, eelviljast ja põhumassist, mulla harimise viisist ja külviajast. Soovituslikult 50-60 kg N/ha.

*** väga kiireks kaltsiumi, boori ja lämmastiku omastamiseks rapsi aktiivse kasvu faasis, samuti stressi (põua) tingimustes.

■ Mulda viidav väetis ■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.