



Knowledge grows

Maasikas

Avamaa, mulla- ja lehekaudne väetamine



Vegetatiivse kasvu alguses



Enne õitsemist



Õitsemise ajal



Marjade moodustumisest kuni valmimiseni



Valmimise/saagikoristuse ajal



Pärast saagikoristust

LEHEKAUDNE VÄETAMINE

YaraTera®

CALCINIT 5 kg/ha
+
TENSO COCKTAIL 0,5 kg/ha

CALCINIT
5 kg/h iga 7-10 päeva järel

YaraVita®

ACTISIL
0,5-1 l/ha 2x 5-7 päevase
vahega

KRISTALON
18-18-18 SPECIAL
3 kg/ha

KRISTALON
13-40-13 YELLOW
3 kg/ha

KRISTALON 6-12-36
ORANGE
3 kg/ha iga 7-10 päeva järel,
vaheldumisi
CALCINIT'iga

KRISTALON 6-12-36
ORANGE
3 kg/ha 2x 5-7 päevase
vahega

YaraTera®
KRISTALON®

MULLAPÕHINE VÄETAMINE

YaraMila®

COMPLEX 12-11-18
või
CROPCARE 11-11-21*
150-200 kg/ha

COMPLEX 12-11-18
250 kg/ha
või
CROPCARE 11-11-21*
150-200 kg/ha

YaraLiva®

NITRABOR
150 kg/ha

NITRABOR
100 kg/ha

* YaraMila CROPCARE 8-11-23 150-200 kg/ha

Mulda viidav väetis

Leheväetis

Kontrollige toodete kokkusobivust paagisegudes teiste Yara toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses **TankmixIT**. Enne Yara väetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett. Lehekaudset väetamist ei ole soovituslik teha intensiivse päikesepaiste, väga kõrgete või väga madalate temperatuuride korral ega ka närbumistunnustega taimedele.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel. Programmis esitatud kulunormid on soovituslikud ning neid tuleb korrigeerida vastavalt mulla- ja leheanalüüsidele, ilmastikutingimustele ja taimiku olukorrale.