

Suvinisu väetamisprogramm



	Koos külviga	BBCH 20-29 Võrsumisfaas	BBCH 30-32 Kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlmeni	BBCH 30-39 Kõrsumise algusest kuni lipulehe faasini	BBCH 51-79 Loomisfaasist kuni piimküpsuseni
--	--------------	----------------------------	--	---	---

YaraMila[®]

**NPK(S)*
18-11-13-(5),
B, Mg**
300-350 kg/ha
või
NPK(S)
20-5-15-(5), B**
300-400 kg/ha

YaraBela[®]

AXAN 27N-4S
200-250 kg/ha

AXAN 27N-4S
100-150 kg/ha

YaraVita[®]

GRAMITREL
1,0-2,0 l/ha
või
KOMBIPHOS
2,0-3,0 l/ha***

GRAMITREL
1,0-1,5 l/ha
või
UNIVERSAL BIO
1,0-2,0 l/ha

THIOTRAC
3,0-4,0 l/ha

* Või **NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg**. Piisava kaaliumisisaldusega muldade puhul soovitame kasutada **NPK(S) 18-9-9-(5), B, Mg**.

** Või **NPK(S) 21-6-12-(9), B, Mg**.

*** **YaraVita KOMBIPHOS**i kasutada madala fosforisisaldusega muldade puhul või siis, kui fosfori omastamine taimede poolt mullast on häiritud.

■ Mulda viidav väetis ■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.